

Дозировки и нюансы некоторых рецептов by **MEDORRHEA**

Tab.

0.1

Metoprololi
Libexini
Dichlothiazidi
Erythromycini
(Dr.) Diazolini

0.01

Anaprilini
Aethaperazini

0.001

Prasosini
Prednisoloni
Phenazepami

0.0001

Reserpini
Digitoxini

0.15

Euphyllini
Ranitidini
Butadioni
Rifampicini (caps.)

0.015

Vicasoli
Proserini

0.00015

Clophelini
(Supp.cum) Digitoxino

0.06 Validoli

0.008 Bromhexini

0.117 Diphenini

0.5

Ac. acetylsalicili
Analgini
Paracetamoli
Magnesii oxydi
Cefalexini
Aethazoli
Sulfadimetoxini
Phthalazoli

0.05

Neodicumarini
Thyreoidini
Ac. ascorbinici
Ac. nicotinici
Dimedroli
Validoli (caps.)
Phenobarbitali
(Dr.) Aminazini
Triftazini
Furazolidoni
Nitroxolini

0.005

Pirileni
Isadrini
Mercazolili
Diazepami
Haloperidoli

0.0005

Nitroglycerini
Dexamethasoni

“Sustac-forte”

“Nitrong”

“Cholenzymum”

“Bactrimum”

0.2

Coffeini-natrii benz.
Amiodaroni
Ferri reducti
Pyracetami

0.02

Dibazoli
Tab. Extr. Valerianae
obductae

0.25

Novocainamidi
Butamidi
Chlorpropamidi
(Dr.) Lidocaini hydroch
Laevomycetini
Laevomycetini (caps.)
Levodopae
Tetracyclini
Cefalexini (caps.)

0.025

Octadini
Ephedrini hydroch.
Captoprili
Diclophenac-natrii
Suprastini
Amitryptilini
(Dr.) Indomethacini
Indomethacini (caps.)

0.3

Natrii bicarbonatis
Isoniazidi

0.4

Pyracetami (caps.)
Ethambutoli

0.04

Furosemidi
Verapamili

Amp.

1%-1ml

Galanthamini hydrobr.
Mesatoni
Morphini hydroch.
Promedoli
Dibazoli
Vicasoli
Progesteroni ol.
Testosteroni prop.ol.
Ac. Nicotinici
Dimedroli

1%-2ml

Furosemidi
Amitryptilini

2%-1ml

Suprastini

2%-10ml

Novocaini
Lidocaini hydroch.

2,5%-1ml

Benzohexonii

2,5%-2ml

Aminazini

5%-1ml

Ephedrini hydroch.
Retabolili ol.

5%-3ml

Amiodaroni

Sol.

Pituitrini 1ml
Cordiamini 1ml

0.1%-1ml

Atropini sulf.
Anaprilini
Oestradioli diprop.ol.

0.2%-1ml

Plathyphyllini hydrotar
Triftazini

0.5%-1ml

Haloperidoli

0.5%-2ml

Diazepami

0.25%-2ml

Verapamili

0.01%-1ml

Cyancobalamini
Clophellini

0.05%-1ml

Strophanthini K
Proserini

10%-2ml

Coffeini-natrii benz.

10%-5ml

Novocainamidi

20%-2ml

Camphorae ol.

20%-5ml

Pyracetami

25%-10ml

Magnesii sulf.

50%-1ml

Analgini

Флак.

1%-5ml

Adrenalini hydroch.
Nitroglycerini
Pilocarpini hydroch.
Atropini sulf.

1%-10ml

Viridi nitentis

2%-10ml

Ephedrini hydroch.

5%-10ml

Iodi spirituosae

0.5%-25ml

Isadrini

0.25%-200ml

Novocaini (St!)

0.1%-500ml

Kalii permanganatis

0.9%-500ml

Natrii chloridi

isotonicae (St!)

1:5000-200ml

Furacillini

Sol.

Tinc. Valerianae 25ml

Cordiamini 15 ml

Validoli 5ml

Insulini pro inj. 5ml(dtd)

Succi gastrici naturalis
100ml

Acidi hydrochloridi
diluti 50ml

Inf. herbae Thermopsidis
0.5-200ml

Inf. folii Sennae 20.0-
200ml

Дозировки и нюансы некоторых рецептов by **MEDORRHEA**

Rp.: Codeini phosphatis 0.01

Natrii bicarbonatis 0.3

M.f. pulvis

D.t.d. N. 12

S. По 1 порошку 3 раза в день, растворяя в ½ ст. воды, при кашле

###

Rp.: Magnesii sulfatis 30.0

D. S. Внутрь как слабительное, развести в ½ ст. теплой воды.

###

Rp.: Sol. Nitroglycerini oleosae 1%-0.0005

D.t.d. N. 10 in capsulis gelatinosis

S. По 1 капсуле под язык (раздавлив зубами) при приступах стенокардии

###

Rp.: Benzylpenicillinum-natrii 500 000 ЕД

D.t.d. N. 20

S. Вводить в/м 4 раза в день, разводя в 5 мл 0,5% раствора новокаина, при бронхите, цистите, холангите

###

Rp.: Sol. Novocaini 0.5%-5ml

D.t.d. N. 20 in amp.

S. Для разведения бензилпенициллина.

###

Rp.: Tab. Nistatini 500 000 ЕД N.20

D. S. По 1 таблетке 3-4 раза в день при кандидозах.

###

Rp.: Ung. Hydrocortisoni 2.5%-5.0

D.S. Наносить на пораженные участки кожи 3-4 раза в день при

Воспалительных и аллергических заболеваниях кожи (аллергическом и контактном дерматите, экземе, нейродермите и др.)

###

Rp.: Ung. Prednisoloni 0.5%- 10.0

D.S. Для местного применения при кожных заболеваниях немикробной этиологии (экзема, зуд, дерматиты и др.), наносить тонким слоем на кожу 1 - 3 раза в день.